

園區的八哥們 - 棕鳥族


目前平地常見的八哥有嘴巴黃色的「白尾八哥」及「家八哥」，只出現在臺灣西岸的原生二級保育鳥「八哥」嘴巴是象牙白。由於被棄養的白尾八哥在野外繁殖迅速，數量多到有「白化白尾八哥」的突變種，嚴重排擠食性與生態棲位相似的台灣原生種鳥類，尤其是台灣八哥，此外，白尾八哥也會趕殺麻雀幼鳥，致使城市裡的麻雀數量銳減！



八哥 / 特有種、二級保育



白尾八哥 / 族群最大



家八哥



白化白尾八哥 / 數量多到竟然可以有突變種



所謂「特有種」鳥類，就是其特徵與外觀明顯地與同科的其他鳥種不同到可以自成一個種類，而且只生存在某一特定地區，其他地區看不到。

棕鳥族

輝椋鳥

身長約 20cm，眼睛為紅色，看起來頗為邪惡。食性以果實為主，亦吃昆蟲。為高度社會化的鳥種，成群覓食、繁殖及棲息。



黑領椋鳥

體長約 28 公分，雌雄同型，雜食性，以地面的昆蟲、蚯蚓、蝸牛、草籽、穀物、果實等為食。在野外快速繁殖已威脅到本土鳥類的生態！會利用人工建物的高處作為巢位，當年因為追蹤高處築巢的黑領椋鳥而發現黑翅鳶！非常適應人類環境，但對於人的警戒性仍高，一發現人接近會迅速直線飛離。



灰頭椋鳥

又名栗尾椋鳥，身長約 22 公分，雜食性，喜歡在樹的上層覓食，是八哥科中和樹關係最密切的鳥種之一。1998 年首次在臺灣野外有紀錄，目前對於其入侵後造成的危害不明。



原通稱的椋鳥，不知何時被稱為掠鳥，可能是因為字形相似的關係，不過就其對食性與生態棲位相似的鳥類所造成掠奪性的影響，稱掠鳥似較為名符其實。



綠意盎然

橫山無患子的季節步道



有感於無患子雖是本土的防風樹種，奈何古調雖自愛，今人多不種，所以在園區不是種一棵或種三五棵，而是要種出一條無患子的季節步道，好讓大家再次領略冬季落葉前，這長滿樹、又灑落滿地的浪漫金黃無患子，還有冬季陽光印在大地的悠閒迷人光影。

在落葉的季節，如果你總是急著將落葉清除，那就可惜了這等待了一年的季節感了！有些落葉是值得保留的，因為不只落花不是無情物，落葉也是。




金黃落葉



被誤認為蜂鳥的長喙天蛾

長喙天蛾俗稱台灣蜂鳥、飛蝦，身長約 4 公分，展翅約 5 公分，重約兩公克，飛行速度極快，振翅速度每秒可達 30 下，更有像直升機般定點停在空中伸出原本蜷曲在頭部下方口器，吸食眼前各種花蜜的飛行能力！因為能這樣的凌空停留，才會被人類的眼睛捕捉到而被誤以為是蜂鳥。



風鈴木、黃金風鈴木及洋紅風鈴木與黃鐘花

風鈴木



開花時葉子幾乎落盡，花期在 12-2 月，葉子寬圓、鋸齒小而密

黃金風鈴木



開花時葉子幾乎落盡，花期在 2-4 月，葉面粗糙，葉背有明顯絨毛

洋紅風鈴木



開花時經常花、葉並存，花期在 3-5 月，葉長橢圓，鋸齒疏或無

黃鐘花



風鈴木近親，花期幾乎全年，葉質薄，狹長粗鋸齒（小喬木或大灌木）



發現中科生物大事記



土番鴨

